

Javasolt növényvédő szerek hajtattott kínai kelnél 2020.

Délalföldi Kertészek Szövetsége

Hatóanyag	Készítmények	Kórokozók kártevők	Dózis	Dózis 10 liter vízhez	M.V.I.(nap)	DélKerTÉSZ által meghatározott É.V.I.(nap)	Megjegyzés
I. talajfertőtlenítés és egyéb szerek							
Coniothyrium minitans	Contans WG	Szklerotiniás tópusztulás	2-4 kg/ha		0	nk	max. 1 talajkezelés 250-400 l/ha vízzel
Pythium oligandrum	Polyversum	csirakori betegségek	0,05%	2 g/100m ² vagy 2-3 g/10 l víz	0	nk	max. 1. kezelés, palánta, gyökerek áztatása
		alternáriás-, fómás betegség, káposzta peronoszpóra	0,2 kg/ha		0	nk	max. 2 kezelés kezeléseik között min. 14 nap, 2 leveles állapotól (BBCH 12) 80%-os fejméret
Steinernema carpocapsae	Nemastar parazita fonálféreg	kifejlett vakondtücsök, vetési bagolylepkéhernyő	90g/100m ² 1L/m ² permetlé		0	nk	max. 4 alkalommal
metaldehid	DetiaDegesch, Schneckenkorn, Shift, Shikari, Shalimar, Shamu	meztelen csigák	0,6 g/m ²		0	nk	a granulátumot csak a fóliasátor, üvegház szélén, a búvóhelyek környékén szabad a talajfelszínre sávosan kijuttatni, levélre ne kerüljön
cinkfoszfid	Arvalin LR	lőtücsök, mezeipocok	1-3 szem/járat 6-15g/100 m ²		0	nk	a granulátumot csak a fóliasátor, üvegház szélén, a búvóhelyek környékén szabad a talajfelszínre sávosan kijuttatni, levélre ne kerüljön
II. Gombabetegségek							
azoxistrobin	Amistar , Mister, Mirador	peronoszpóra, alternária	0,75 l/ha	7,5 ml	0	14	max. 2 kezelés, kezeléseik között min. 7 nap, utolsó kezelés 50% fejméret
azoxistrobin+ difenokonazol	Amistar Top	peronoszpóra, alternária	0,6-1 l/ha	6-10 ml	0	14	max. 2 kezelés, kezeléseik között min. 14 nap, utolsó kezelés fejesedésig
réz I. oxid*	Nordox 75 WG	baktériumos betegség, peronoszpóra	0,14-0,17 %	15 g	0	21	
* réztartalmú szereket kínai kelnél az alacsonyabb dózisban használjuk, mert perzselhet!							
III. Állati kártevők							
alfa-cipermetrin (alfametrin)	Fendona 10 EC, Bestseller 100 EC	bagolylepké lárva	0,1 l/ha	3 ml	0	21	max. 2 kezelés, kezeléseik között min. 10 nap, utolsó kezelés 80% fejméret
	Eribea						
	King 10 F						
spinozad	Laser	fehér lepkék és bagolylepkék lárvai	0,4 l/ha	4 ml	0	7	max. 3 kezelés, kezeléseik között min. 7 nap, 80% fejméretig
	Laser Duplo		0,2 l/ha	2 ml			
pirimikarb	Pirimor 50 WG	levéltetvek	0,4 kg/ha	4 g	3	10	max. 2 alkalommal, kezeléseik között min. 14 nap, 50% fejméretig
Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki	Lepinox Plus	hernyókártevők	1 kg/ha	10 g	0	nk	max. 3 kezelés, kezeléseik között min. 7 nap. szedés érettségig

Jelölések	
**	I-es kategória
E,EC,L,LC	emulzióképző folyékony permetezőszer
WP,W, Sp	nedvesíthető, por alakú permetezőszer
E,FL, WSC	vizoldható folyékony készítmény
EW	olajemulzió vizes fázisban
FW	vizes törzsszuszpenzió
D	porzószerszer
G	granulátum
DF, DG, WG	vízben diszpergálható/oldható
OD	Olajos diszperzió
MVI	munkaegészségügyi várakozási idő
ÉVI	ételmezés-egészségügyi várakozási idő
nk	nincs korlátozás

2020. január 24.

Ledó Ferenc
Növényvédelmi Szakmérnök

Balázs Máté
Növényorvos